

日本小動物がんセンター 犬リンパ腫プロトコール (変更型UW25⁽¹⁾)

導入期

Week1 (/ /)
 ビンクリスチン (0.525~0.7mg/m², IV bolus)
 デキサメサゾン (0.5mg/kg, IV)
 2日目~ プレドニゾロン (2mg/kg, PO, q24hs)
 エンフロキサシン (5mg/kg, PO, q24hs)

Week2 (/ /)
 サイクロフォスファミド 250mg/m², IV bolus
 プレドニゾロン (1.5mg/kg, PO, q24hs)

Week3 (/ /)
 ビンクリスチン (0.7mg/m², IV bolus)
 プレドニゾロン (1.0mg/kg, PO, q24hs)
 ェーアスパラキナーゼ (400IU/kg, im ⁽²⁾)

Week4 (/ /)
 ドキソルビシン (30mg/m² ⁽³⁾)
 25~100ml生食に希釈し60分かけて静脈内投与
 プレドニゾロン (0.5mg/kg, PO, q24hs)
 FS= %

Week5 (/ /)
 CBC

Week6 (/ /)
 ビンクリスチン

Week7 (/ /)
 サイクロフォスファミド

Week8 (/ /)
 ビンクリスチン

Week9 (/ /)
 ドキソルビシン

Week10 (/ /)
 CBC

維持期

Week11 (/ /) ⁽⁴⁾
 ビンクリスチン

Week13 (/ /)
 サイクロフォスファミド

Week15 (/ /)
 ビンクリスチン

Week17 (/ /)
 ドキソルビシン

Week18 (/ /)
 CBC

Week19 (/ /)
 ビンクリスチン

Week21 (/ /)
 サイクロフォスファミド

Week23 (/ /)
 ビンクリスチン

Week25 (/ /)
 ドキソルビシン
 FS %

Week26 (/ /)
 CBC

Week27 以降
 2~4週毎に身体検査

ID. _____

患者名 _____

1) Garrett LD, Thamm DH, Chun R. et al. Evaluation of a 6-month chemotherapy protocol with no maintenance therapy for dogs with lymphoma. J Vet Intern Med. 16:704-709, 2002. 2) Week3までに完全寛解を確認できない場合はL-アスパラキナーゼを追加 3) 10kg以下の患者には1mg/kgを使用 4) Week10までに完全寛解を確認できない場合はレスキュー・プロトコールへ移行すること